



CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –TCC II

**ANA BEATRIZ SANTOS PEREIRA
NATHALIA MORAIS DE PAULO SARAIVA**

**A IMPORTÂNCIA DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO
PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO**

FORTALEZA

2020

ANA BEATRIZ SANTOS PEREIRA
NATHALIA MORAIS DE PAULO SARAIVA

A IMPORTÂNCIA DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO
PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO.

Artigo TCC apresentado ao curso de Bacharel em Enfermagem da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – UNIFAMETRO – como requisito para a obtenção do grau de bacharel, sob a orientação da Prof.^a Me Jéssica Lima Benevides

FORTALEZA

2020

ANA BEATRIZ SANTOS PEREIRA
NATHALIA MORAIS DE PAULO SARAIVA

**A IMPORTÂNCIA DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO
PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO**

Projeto de pesquisa apresentado à
Coordenação do Curso de Graduação
em Enfermagem do Centro Universitário
Fametro – UNIFAMETRO, como parte
do requisito para aprovação na
disciplina de TCCII.

Aprovado em ____/____/____

BANCA AVALIADORA

Profa. Ms. Jéssica Lima Benevides - Orientadora

Centro Universitário Fametro – Unifametro

Mestre em Enfermagem Rayssa Matos Teixeira - Examinadora

Universidade Federal do Ceara – UFC

Mestre em Ciências Médico-Cirúrgico Suellen Viana Lucena - Examinadora

Universidade Federal do Ceara – UFC

**À Família de Ana Beatriz Santos Pereira.
À Família de Nathalia Morais de Paulo Saraiva.**

AGRADECIMENTOS

À Deus por nos permitir vivenciar essa realização e está conosco a cada instante dessa caminhada.

À Prof. Me. Jéssica Lima Benevides, por sua orientação, paciência, compreensão e sua valiosa ajuda na realização deste trabalho.

Às nossas famílias, que foram incentivadoras e por nos ensinar que podemos conseguir tudo o que desejamos honestamente e pelo amor incondicional.

SUMÁRIO

1 RESUMO	7
2 INTRODUÇÃO	8
3 OBJETIVOS	11
4 MÉTODOS	12
4.1 DELINEAMENTO	12
4.2 BUSCA NA LITERATURA	12
4.3 ANÁLISES DE DADOS	13
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	15
5.1 CARACTERIZAÇÃO QUANTO AO TIPO DE ESTUDO	19
5.2 CARACTERIZAÇÃO QUANTO AO TIPO DE RELEVÂNCIA	19
5.3 CARACTERIZAÇÃO QUANTO AS CATEGORIAS DE ANÁLISES	20
6 CONCLUSÃO	21
REFERÊNCIAS	22

1. RESUMO

Objetivo: do trabalho é revisar trabalhos publicados em nível nacional em relação aos atributos essenciais à saúde no atendimento à gestante no pré-natal de baixo risco. **Métodos:** uma revisão integrativa nas bases de dados: MEDLINE e SCIELO, com vista a responder a seguinte questão: Quais as evidências científicas nacionais sobre os atributos da atenção primária oferecidos às gestantes de baixo risco? Os critérios de inclusão foram: estudos que abordassem os atributos essenciais no atendimento no pré-natal, totalizando 06 artigos. **Resultados:** Os artigos foram publicados entre 2009 e 2020, todos há nível nacional. Dentro da pesquisa, procurar abordar o nível de satisfação das gestantes durante a consulta, assim avaliado pelos atributos. **Conclusão:** as pesquisas mostram satisfação das gestantes durante as consultas, às análises foram realizadas em poucos estados brasileiros.

Palavras-chave: Atendimento primário de saúde. Gestação. Saúde das mulheres. Avaliação econômica em saúde. Longitudinalidade. Integralidade.

2. INTRODUÇÃO

A gestação é o período de constante transformação que as mulheres passam em sua vida. São grandes alterações entre várias fases de experiências intensas, repleta de momentos únicos e incríveis, tanto se a gravidez tiver sido desejada, como também para a gravidez inesperada. (OLIVEIRA, 2018).

Durante a gestação o corpo irá se modificar lentamente, se preparando para o parto e a maternidade, proporcionando a gestante passar por descobertas e adaptações nessa nova etapa de sua vida e da vida a qual ela está gerando. (SILVA *et al.*, 2019).

Nesse sentido é dentro da atenção primária que as gestantes recebem o referido apoio, acompanhamento e tratamento para essa linha de cuidados. Tendo como objetivo do acompanhamento pré-natal assegurar o desenvolvimento da gestação, e permitir que o parto de um recém-nascido seja saudável e prazeroso para as gestantes, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. (BALSELLS, 2018).

A atenção primária à saúde da gestante cada vez mais vem buscando alcançar à comodidade da usuária e facilitar o acompanhamento profissional por meio do modelo de Redes de Atenção à Saúde (RAS), buscando erradicar as taxas de mortalidade maternas infantis com o objetivo e a finalidade de garantir todos os atributos da atenção primária a gestantes e seus familiares. (BATISTA, 2019).

Nesse sentido, para que a APS se consolide de maneira adequada, Starfield (2002), conceitua a necessidade de atributos essenciais da APS, a saber: acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. Compreendê-los permite que haja eficiência, máxima eficácia, utilização de práticas preventivas, e equidade sobre o acesso aos serviços de saúde. (PEREIRA, 2013)

Os atributos da APS e suas características mais importantes. Acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde: primeiro contato do usuário e comunidade no serviço de saúde que implica na resolução do problema

ou tratamento contínuo caso necessite. Longitudinalidade: assistência continuada ao paciente por um longo período de tempo possibilitando uma relação interpessoal entre profissional e cliente. Integralidade: são ações do serviço de saúde que abrange atenção integral aos usuários de acordo com suas necessidades, em outros serviços que compõe o sistema de saúde. Coordenação da atenção: múltiplas ações prestadas por outros serviços de saúde (OLIVEIRA, 2013).

O acesso de primeiro contato compreende-se como a acessibilidade da gestante utilização da rede de saúde para o seu acompanhamento. O serviço, este deve proporcionar acessibilidade, por exemplo, em seu horário de funcionamento, localização e na possibilidade de atendimento em consultas programadas ou agendadas. (ALVES, 2020)

Neste sentido na assistência pré-natal, a integralidade se consolida na medida em que são oferecidas consultas ambulatoriais de acompanhamento, exames de rotina para monitoramento da condição física da gestante e feto, bem como atendimento a possíveis intercorrências que necessitem de assistência hospitalar, assim como o parto. Além disso, as equipes oferecem integralidade quando se propõe a promover a saúde das usuárias, respeitando suas especificidades e valorizando o contexto em que a gravidez se insere, incluídos fatores de ordem econômica, social e cultural. (BRASIL, 2012).

A Longitudinalidade tem como princípio a atenção continuada, assim dispondo da confiança entre usuário e profissional. Esse atributo é de uma grande importância no pré-natal, para haver uma continuidade no cuidado a gestante visando assim o vínculo interpessoal entre a mulher e os profissionais que acompanham, a fim de obter resultados satisfatórios durante sua gestação. Através disso podendo Abordar de maneira mais pessoal suas necessidades, de forma oportuna e adequada. (HARZEIM *et al.*, 2013).

A coordenação da atenção presume uma forma de continuidade do atendimento ou tratamento que a gestante precisa, deve ser capaz de integrar todo cuidado que a paciente deve receber através da coordenação entre os serviços. O propósito é oferecer à usuária uma soma de serviços e informações

que respondam a suas necessidades de saúde de forma integrada, por meio de diferentes pontos da rede de atenção à saúde. (MIN. SAÚDE, 2013)

Assim, para traçarmos metas de aprimoramento das ações e serviços de saúde no cunho da atenção primária, faz-se necessário analisar a assistência que está sendo oferecida por meio de ferramentas avaliativas. Neste sentido, para avaliar os atributos da APS, o Ministério da Saúde conta com um instrumento traduzido, adaptado e validado no Brasil, o PCATOOL. Com ele podemos medir a presença e a extensão dos atributos da APS de maneira detalhada, proporcionando direcionamento sobre os obstáculos apresentados para condução de planos de melhoria mais assertivos. Sua importância vai além da pesquisa, ela abrange a melhoria do sistema de saúde, por meio dos resultados postos, garantindo um desenvolvimento na parte estrutural e processual. (BRASIL, 2012).

Neste cenário emergem a seguinte questão norteadora: Quais as evidências científicas nacionais sobre os atributos da atenção primária oferecidos às gestantes de baixo risco?

3. OBJETIVOS

Analisar as evidências científicas disponíveis nas literaturas nacionais relativas à avaliação dos atributos da Atenção Primária à Saúde ofertada no cuidado do pré-natal de baixo risco.

4. MÉTODOS

4.1 Delineamento

Trata-se de uma revisão integrativa, é um método de pesquisa sobre o conhecimento já levantado em trabalhos sobre um assunto determinado. Uma metodologia que adéqua novas teorias e uma síntese do conhecimento que tem como intenção sintetizar resultados obtidos em análises sobre um tema ou questão, de maneira ordenada, sistemática e abrangente com oportunidades para o surgimento de pesquisas num assunto específico. (BOTELHO *et al.*, 2011).

O estudo caracteriza-se como uma abordagem qualitativa, que visa identificar a importância que os atributos à atenção primária possuem quando ofertados as gestantes que realizam pré-natal de baixo risco.

A revisão integrativa da pesquisa é uma parte valiosa do processo de criação e organização de um corpo de literatura. Tem-se argumentado que as revisões integrativas devem seguir os mesmos padrões de clareza, rigor e replicação da pesquisa primária. As mesmas visam contribuir no processo de síntese e análise dos resultados de estudos independentes e, segundo Ganong (1987), algumas etapas importantes devem ser seguidas: desenvolver uma pergunta norteadora a partir do tema proposto; buscar na literatura estudos seguindo critérios de inclusão pré-definidos; seleção da amostra; utilizar um instrumento de coleta de dados para auxiliar na organização dos estudos; análise sistemática dos dados; interpretação e discussão; relatar a revisão da forma mais clara e completa possível.

4.2 Busca na literatura

Foi realizada uma busca na literatura na base de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), por meio da busca manual, com pesquisadores independentes.

Não houve limitação de tempo para inclusão dos artigos, apenas limitação de idioma português, das publicações realizados no Brasil, cujo estudo abrangesse pesquisas de campos e que estivessem disponíveis na íntegra. A seleção dos estudos para compor a amostra obedeceu aos seguintes critérios


de inclusão: publicações de 2009 até 2020 (últimos onze anos), e estudos que abordassem pelo menos um dos atributos à saúde na atenção primária relatados pelas gestantes no contexto de assistência ao pré-natal de baixo risco.

Foram excluídos da seleção, os artigos que, após leitura dos títulos e dos resumos, não se enquadraram no foco deste trabalho e aqueles que avaliaram a qualidade da assistência ao pré-natal em outros países. Os instrumentos que utilizamos foram teses, dissertações e artigos. Utilizaram-se as palavras - chaves: Atendimento primário de saúde. Gestação. Saúde das mulheres. Avaliação econômica em saúde. Longitudinalidade. Integralidade.

4.3 Análises de dados

Os resultados encontrados nesta revisão sobre a contemplação dos atributos na atenção primária à saúde no pré-natal de baixo risco, foram dispostos com auxílio de um quadro como síntese de caracterização dos estudos, onde foram comparados e agrupados de acordo com a semelhança de seus respectivos conteúdos, fizeram referência em objetivos, os principais resultados, delineamento e o seus respectivos níveis de evidência dos artigos que representam os assuntos identificados.

Figura 01 – fluxograma da seleção de artigos incluídos no estudo



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo tem como critério apresentar e discutir os achados da literatura referentes aos atributos da atenção primária a saúde no atendimento de pré-natal a gestante de baixo risco, através de estudos originais e nacionais. Neste contexto, os artigos e publicações de trabalhos científicos foram lidos, selecionados criteriosamente. A Figura 1 mostra o fluxograma com os resultados numéricos obtidos desde a busca inicial, que resultou na localização de 10 estudos no banco de dados SciELO, 01 no MEDLINE, 11 estudos, até a busca final, onde resultou. A aplicação dos quatro filtros possibilitou refinamento que resultou em seleção final de 06 publicações, com base na relevância e na qualidade dos dados para o presente estudo.

Como apresentado na figura 1, dos artigos selecionados para análise final de conteúdo, todos foram referentes a estudos sobre os atributos essenciais no pré-natal, com foco na avaliação da qualidade da assistência pré-natal de localidades brasileiras, publicados em periódicos nacionais, três estudos em municípios nordestinos; um sobre um Estado da região Norte; dois em municípios da região Sudeste.

Starfield (2002), enfatiza que os quatro atributos essenciais da atenção primária são de extrema importância para o andamento adequado nos atendimentos de pré-natal. Tendo assim uma visão ampliada sobre a prática assistencial e relação entre profissionais da saúde e paciente.

O PCATool é um instrumento utilizado no Brasil, com atributos propostos originalmente por Starfield, por fim de avaliação da estrutura e do processo dos serviços na APS. Assim escolhido como instrumento deste estudo com o intuito de avaliar o serviço de saúde, para definir estratégias que possam mensurar a qualidade prática e funcional da APS nas consultas de pré-natal. (HARZEIM *et al.*, 2013).

De acordo com NEDER, 2019 que a unidade básica de saúde apresentou escore médio atribuído foram de $3,13 \pm 1,93$ na atenção primária. O acesso de primeiro contato se mostrou a dimensão com os mais baixos escores com 3,14. A longitudinalidade apresentou na UBS escores de $5,674 \pm 2,33$.

Santos, 2020 - foram avaliados os atributos essenciais em quatro centros de Saúde da Comunidade, duas em diretor norte e duas localizadas em diretor sul em Palmas- TO. Os resultados foram Acesso de primeiro contato - Utilização 7.3 (2.6) região Sul 01; 7.4 (2.7) norte 01; 8.2 (2.0) sul 02; 8.1 (2.2) norte 02. Longitudinalidade 6.8 (1.0) região sul 01; 6.6 (1.3) região sul 02; 6.9 (1.3) região norte 01 7.0 (1.6) região norte 02. Coordenação - Integração dos cuidados 9.4 (1.1) região sul 01; 8.2 (1.6) região sul 02; 7.9 (2.5) região norte 01; 8.6 (2.4) região norte 02. Integralidade - Serviços prestados 5.2 (2.4) região sul 01; 4.0 (1.9) região sul 02; 2.6 (1.1) região norte 01; 4.6 (2.3) região norte. 02. Orientação Familiar 6.6 (2.7) região sul 01; 6.2 (2.8) região sul 02; 4.9 (2.8) região norte 01; 5.6 (3.4) região norte 02. A Longitudinalidade foi um atributo que alcançou o valor mínimo de satisfação para APS em todas as unidades de saúde e A coordenação foi considerada satisfatória em todas as unidades de saúde.

SILVA *et al.*, 2018 verificou que nos serviços da atenção básica no município de Caruaru-PE o perfil longitudinal da APS o resultado de média geral apresentado que foi de 6,93. Vendo que o resultado cumpre com avaliação adequada ara o atendimento prestado as gestantes entrevistadas.

Quadro 1. Síntese dos artigos que integraram a amostra da revisão integrativa.
Fortaleza, CE, Brasil, 2020.

Autor/Ano	Região	Objetivo	Resultados	Delineamento	Nível de Evidência
SILVA et al, 2018	NORDESTE	Avaliar o atributo da longitudinalidade do cuidado sob a perspectiva das gestantes atendidas em serviços da Atenção Básica no município de Caruaru-PE, mediante utilização do instrumento <i>Primary Care Assessment Tool</i> (PCATool-Brasil).	Atributo longitudinalidade , nesse aspecto, o presente estudo verificou que existem bons resultados relacionados à eficiência e eficácia da assistência pré-natal no âmbito da atenção primária à saúde, principalmente quanto à preocupação com a solicitude dos exames e cobertura vacinal, sendo esta uma preocupação sanitária.	Estudo Transversal, descritivo.	II – a
SILVA et al, 2014	NORDESTE	Analisar o acesso e o acolhimento no cuidado pré-natal à luz das experiências de 13 gestantes. O material empírico foi obtido por meio de entrevistas e analisado sob a óptica da análise do discurso.	Os resultados evidenciam dois eixos temáticos: o primeiro aborda o acesso aos serviços de assistência pré-natal; e o segundo focaliza questões relacionadas à interação e à comunicação da gestante com o profissional.	Estudo Qualitativo	II – b
NEDER, 2019	SUDESTE	O objetivo do presente estudo foi analisar o pré-natal de um grupo de puérperas quanto aos atributos da atenção primária acessibilidade e longitudinalidade. Para alcançar este objetivo foram realizadas 80 entrevistas com mulheres que realizaram pré-natal na atenção primária e 19 mulheres que realizaram pré-natal no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM).	Quanto à atenção primária, os resultados demonstraram a ESF como favorecedora tanto da acessibilidade quanto da longitudinalidade. A ESF tem sido o modelo de reestruturação da atenção primária no Brasil e cerca de metade da população brasileira é beneficiada. Embora sua implantação seja recente, começa-se a evidenciar a eficácia desse modelo de atenção primária.	Estudo Transversal, quantitativo e descritivo.	IV – b
MELO et al, 2009	NORDESTE	Objetivo de conhecer o Processo de cuidado pré-natal a adolescentes grávidas por profissionais de saúde do	A expansão do PSF tem ampliado as possibilidades de universalizar o cuidado à saúde, uma vez que as	Tipo exploratório, descritivo, com	II - a

		PACS/PSF e analisá-lo na perspectiva da integralidade.	equipes têm sido implantadas, prioritariamente, em locais cujas comunidades apresentam limitação de acesso aos serviços de saúde, tendo como princípios orientadores a integralidade, a equidade e a participação social. O trabalho em equipe constitui-se em uma das premissas do PSF para a produção de impactos sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde-doença.	abordagem qualitativa.	
LIMA et al, 2018	NORTE	Analisar a consecução dos atributos da APS na prática das equipes, na perspectiva dos profissionais e usuários, comparando-se os resultados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Foram comparados os resultados nacionais de 12.680 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 15.668 equipes e 58.517 usuários.	Apenas parte dos atributos apresentou melhorias do ciclo 1 para o ciclo 2. Os melhores resultados foram primeiro contato e integralidade, confirmando gradual. Constituição da UBS como serviço de porta de entrada acessível, com escopo diversificado de ações, ainda que insuficientes. Os atributos com pior avaliação foram longitudinalidade, com baixa continuidade e qualidade da relação profissional-paciente; e coordenação, por dificuldades de acesso Consultas especializadas e insuficientes registros compartilhados.	Descritivo Transversal	II – a
Santos, 2020	NORTE	Avaliar os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) prestada pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) a gestantes em quatro Centros de Saúde da Comunidade, sendo 2 CSC localizados no plano diretor sul e 2 CSC no plano diretor norte de Palmas-TO. Trata-se de um estudo descritivo,	E os atributos com menores escores foram: Acesso de primeiro contato/ Acessibilidade, Integralidade/sistemas disponíveis, Integralidade/serviços prestados e Orientação comunitária. A partir do estudo concluiu-se que as gestantes consideram	Estudo Descritivo, transversal de natureza quantitativa	II - a

	transversal, de abordagem quantitativa. Para coleta de dados utilizou-se um questionário sociodemográfico e clínico para caracterização do perfil das gestantes, e para avaliar a APS utilizou o instrumento Primary Care Assessment Tool – PCATool/Brasil (versão adulto). Participaram do estudo 80 gestantes. Dentre os itens analisados, os atributos com maiores escores foram: Acesso de primeiro contato/Utilização e Coordenação/integração dos cuidados.	a APS como sua fonte regular da atenção, porém, ficou evidenciada a presença de falhas na assistência devido à maioria dos atributos terem sido avaliados abaixo do desejável, sendo necessário melhorar a estrutura e desempenho da APS para que se possa qualificar a atenção à saúde da mulher, principalmente durante o período gestacional.		
--	---	--	--	--

Com base nos estudos abordados no quadro 01 os atributos essenciais mais bem avaliados diante os estudos abordados foram a integralidade que foi mencionado (80%) dos estudos, longitudinalidade em (10%) e acesso de primeiro contato (10%). Apontados com avaliação baixa integralidade com (33,33%), coordenação com (33,33%) e longitudinalidade com (33,33%).

5.1 Caracterização quanto ao tipo de estudo

Em relação ao desenho metodológico adotado, predominam estudo descritivo com abordagem quantitativo dois (2) artigos cada, sendo dois (2) estudos descritivos com abordagem qualitativa, quatro (4) transversais. Foram 06 estudos de dados.

5.2 Caracterização quanto ao tipo de relevância

Em relação aos níveis de evidências observa-se que 95% dos estudos encontrados são de nível II com evidência alta. SOUZA, *et al.*, 2010 propõe-se uma categoria das evidências, Nível 1: evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados. Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental. Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais. Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem qualitativa. Nível 5:

evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência. Nível 6: evidências baseadas em opiniões de especialistas.

5.3 Caracterização quanto as categorias de análises

A matriz de análise utilizada para a pesquisa contém dados de análise assistencial, composta de atributos de estrutura e processos, estabelecidos em: Autor/Ano, Região, Objetivo, Resultados, Delineamento, Nível de evidência.

Na dimensão assistencial, os atributos de estrutura incluem os critérios: estrutura física, recursos materiais, recursos humanos, instrumentos de registro, protocolo de referência e fluxos. Os atributos de processo englobam os critérios: educação permanente e Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, visita domiciliar, exames laboratoriais, vacina, registro (utilização da caderneta de gestante e registro das informações quanto ao pré-natal) e programação e oferta de ações relativas à consulta, promoção da saúde e classificação de risco.

6. CONCLUSÃO

A análise das produções científicas possibilitou agrupar estudos que avaliaram os atributos essenciais à atenção pré-natal de estado de três grandes regiões brasileiras, Norte, Sudeste e Nordeste. As variações quanto à adequação ocorrem devido às diferentes regiões, aos tipos de consultas utilizados para a assistência, às diferenças de idades entre as gestantes analisadas, bem como à aplicação de diferentes indicadores para mensurar a qualidade da consulta de pré-natal. Os achados deste estudo mostram o aumento da cobertura nos atendimentos da atenção básica a gestante ao longo dos últimos onze anos em algumas regiões do país, a despeito da qualidade, com um nível de satisfação principalmente por um dos atributos essenciais que foi a integralidade.

Destacaram-se como fatores que contribuem para a baixa qualidade da atenção pré-natal a longitudinalidade que trata do acompanhamento do paciente ao longo do tempo por profissionais da equipe de atenção primária em saúde, com isso também contando com o não cumprimento dos exames laboratoriais de rotina, os procedimentos básicos recomendados, as prescrições e orientações durante as consultas. Quando essas variáveis foram adicionadas aos fatores averiguados para qualificação do pré-natal, apontaram para uma queda significativa dos índices à assistência pré-natal. Diante disso, foi evidenciado que a atenção pré-natal do Brasil carece melhorar em alguns aspectos da assistência.

Conclui-se que os estudos de avaliação dos serviços de saúde mostram ser excelentes ferramentas para a análise de condições relacionadas à qualidade da assistência pré-natal. Assim, contribuem como instrumento para estudos futuros relacionados à prática de novas ações e estratégias que promovam a melhoria dos serviços de assistência à gestante em cima dos atributos essenciais à saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, n.32).

OLIVEIRA, Tyane *et al.*, Avaliação do processo na assistência pré-natal de gestantes com risco habitual. **Acta paul. enferm.** vol.31 no.3 São Paulo, Maio/Junho, 2018.

PARENTE, Rosana *et al.*, Acesso e qualidade da atenção pré-natal na Estratégia Saúde da Família: infraestrutura, cuidado e gestão. **Cad. Saúde Pública.** vol.34 no.5 Rio de Janeiro, 2018, Epub. Maio, 2018.

CAVALCANTI, Pauline, *et al.*, Um modelo lógico da rede cegonha. **Revista de saúde coletiva.** ed 23. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde: primary care assessment tool pcatool - Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

STARFIELD, Barbara *et al.*, (2013). Validação do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde: PCATool-Brasil adultos. **Revista Brasileira De Medicina De Família E Comunidade**, 8(29), 274-284.
[https://doi.org/10.5712/rbmfc8\(29\)829](https://doi.org/10.5712/rbmfc8(29)829).

MARQUES, Keila, *et al.*, "ABORDAGENS METODOLOGICAS NO CAMPO DA PESQUISA CIENTIFICA", p. 77-87. In: **Anais do Simpósio de Metodologias Ativas: Inovações para o ensino e aprendizagem na educação básica e**

superior [= **Blucher Education Proceedings**, v. 2, n. 1]. São Paulo: Blucher, 2017.

Balsells MM, Oliveira TM, Bernardo EB, Aquino OS, Damasceno AK, Castro RC, *et al.*, Avaliação do processo na assistência pré-natal de gestantes com risco habitual. **Acta Paul Enferm.** 2018;31(3):247-54.

Batista, L., & Matumoto, S. (2019). Validação de roteiro de sistematização da assistência de enfermagem à gestante na atenção primária. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, 7, e1889.
<https://doi.org/10.25248/reac.e1889.2019>.

Júnior, Helvécio, Redes de Atenção à Saúde: rumo à integralidade, **Divulgação em Saúde para Debate**, Rio de Janeiro, n. 52, p. 15-37, OUT, 2014.

OLIVEIRA, Maria, PEREIRA, Iara, Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família, **Rev. bras. enferm.** vol.66 no.spe. Brasília, Setembro, 2013.

SANTOS, Hanayla Sousa. Avaliação da atenção primária à saúde na perspectiva de gestantes, 2020. 59f. Dissertação (Mestrado em Ensino em Ciência e Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciência e Saúde, Palmas, 2020.

SANTOS, Hanayla Sousa. **Avaliação da atenção primária à saúde na perspectiva de gestantes**. 2020. 59f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Ensino em Ciência e Saúde, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2018.

LIMA, Juliana *et al.*, **Atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde: resultados nacionais do PMAQ-AB**. Saúde debate vol.42 no.spe1. Rio de Janeiro, Setembro, 2018.

SILVA, Maria *et al.*, **Acesso e acolhimento no cuidado pré-natal à luz de experiências de gestantes na Atenção Básica**. *Saúde debate*[online]. 2014, vol.38, n.103, pp.805-816. ISSN 0103-1104. <https://doi.org/10.5935/0103-1104.20140073>.

MELO, Monica *et al.*, **Integralidade e cuidado a grávidas adolescentes na Atenção Básica**. *Ciênc. saúde coletiva* vol.16 no.5. Rio de Janeiro, Maio, 2011.

Botelho LLR, Cunha CCA, Macedo M. The integrative review method in organizational studies. *Gestão e Sociedade*, 2011;5(11):121-36.